


## コンビネーション矯正治療 6)-① 歯列矯正→オールセラミッククラウン

18歳 男性

主訴:他院で矯正治療を開始して1年半になるが、これ以上にはきれいにならないと言われた。真ん中(正中)がズレているのが気になる。現在通院の矯正歯科には不信感いっぱいなので、転院も視野に入れて矯正相談希望。



術前





18歳 男性

主訴:他院で矯正治療を開始して1年半になるが、これ以上にはきれいにならないと言われた。真ん中(正中)がズレているのが気になる。現在通院の矯正歯科には不信感いっぱいなので、転院も視野に入れて矯正相談希望。

術前



# 術前



上顎(うわアゴ)の正中(真ん中)のズレと下顎(したアゴ)の叢生(ガタガタな状態)の改善のためには、3本の永久歯便宜抜歯が必要でした。治療に先立ち、永久歯を抜歯した状態での噛み合わせの確認のために、歯型からセットアップ配列シュミレーションモデルを作製しました。




術前模型



シュミレーション模型



# 術前模型




# シュミレーション模型



# STEP1) 齒列矯正治療

3本の永久歯便宜抜歯による抜歯矯正(抜歯を伴う矯正)で、表側からのマルチブラケット(ブレース)治療を行いました。正面から見た変化を示します。

術前



上顎(うわアゴ)の咬合面から見た変化を示します。

術前



下顎(したアゴ)の咬合面から見た変化を示します。

術前



## STEP2) オールセラミック治療

来院時、前医にすでに変則な抜歯をされていたので、矯正治療終了後、前歯の形態をできるだけ左右対称とするために、オールセラミック治療が計画されました。右上の中切歯部に配列した側切歯の形態をカモフラージュするために、矯正治療に継続して、オールセラミッククラウンの治療を行いました。

矯正治療終了直後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



# before & after

術前



術後



# before & after

術前



術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



術前



before & after

術後



歯をきれいにしたい・・・  
歯を白くしたい・・・  
歯並びをきれいにしたい・・・  
きれいなスマイルに憧れる・・・  
笑顔に自信を持ちたい・・・  
口もとの清潔感を演出したい・・・  
若返りたい・・・  
などなど



たくま歯科医院

お気軽にご相談下さい

【TEL】0120-57-9070/0877-25-9070